

DOĞUM

NORMAL DOĞUM

Eldiven,maske,
önlük ve göz
koruyucu kullan

genel hasta yönetimi ve değerlendirmesi

Oksijen SPO₂≥94 olacak şekilde maske ile ver

Annenin bacaklarını aç, kalçaları battaniye veya minderle yükselt

Damar Yolunu aç
(ringer laktat veya
SF 125 ml/saat-dk
40 damla)

Vajen ağzı etrafında steril alan oluştur

Baş görüldüğünde parmaklarınızı kafatasının kemik kısmına
yerleştirin (Fontanel ve Yüzden sakın).

Baş doğduktan sonra başı destekle

Göbek kordonunun boyuna
dolanıp dolanmadını kontrol et
Kordon dolanması varsa
omuzdan kaydırarak veya
klempleyip keserek çöz

Gövde ve tüm beden geldikçe bebeği her iki elinle destekle

Bacaklar gelirken bacakları kavra

Göbek kordonu kesilene kadar bebeği vajina
hızasında tut

Göbek kordonunu klemple.(İlk klemp
bebekten yaklaşık 10cm ve ikinci klemp 15cm
uzaklıkta olmalıdır.)Klemler arasındaki
göbek kordonunu kes.

www.egitmenparamedik.com

NORMAL YENİDOĞAN BAKIMI

Plasentayı havluya sar,
tıbbi atık poşetine koy.
Perineal bölgeye steril ped
koy perineye yumşak masaj
yap Annenin bacaklarını indir
bir araya toplamasına
yardımcı ol
eğer plasenta çıktıysa
uterusa yumşak masaj yap

Anneyi ve bebeği nakletmeye
hazırlanırken plasentanın çıkışını
gözle

En kısa sürede anneye tenisel
teması ve emzirmeyi sağla

oksitosin ve meterjini
danış

KKM

KKM

Doğum zamanını kaydet anne, bebek ve plasentayı hastaneye naklet



HER
AŞAMADA
NAKİL